

見逃しがちな

令和8年8月


保育施設

感染性胃腸炎発生時のまん延防止のための消毒チェックリスト

嘔吐物や排泄物で汚染された場所は
次亜塩素酸ナトリウム0.1%もしくは**熱湯**で
消毒しましょう

よく触れる場所は
**次亜塩素酸ナトリウム
0.02%**で消毒しましょう

吐物等で汚染された場所・物品




雑巾・モップ



汚染されたリネン類



おもちゃ



ペーパーホルダー

ドアノブ



便座・レバー

トイレ周辺などは汚染されやすい場所です。
汚染された場合は次亜塩素酸ナトリウム0.1%、
目に見える汚染がなければ0.02%で消毒しましょう




ベビーゲート


電話・PCマウス



シンクや
手洗い場



カーテン
机・イス
戸棚



次亜塩素酸ナトリウムには腐食性があるため
金属を消毒後はふき取って乾燥させましょう


具体的にどうやって消毒したらいいの？

【汚染されたリネンや衣類、カーテン】

1. 付着した汚物を取り除く
2. 洗剤を入れた水の中で静かにもみ洗い
3. 85℃、1分間以上の熱水洗濯（熱水洗濯ができれば、次亜塩素酸ナトリウム0.1%に30分程度浸け置き後、高温の乾燥機使用でも可）

【汚染された布団・カーペット】

1. 付着した汚物を取り除き、下洗い
2. 次亜塩素酸ナトリウム0.1%に30分程度浸け置き
3. 洗剤で通常通りの洗濯
（洗えない場合には乾燥後スチームアイロン2分、もしくは布団乾燥機で加熱するのも効果的）




【汚染されたぬいぐるみ】

1. 付着した汚物を取り除き、下洗い
2. 次亜塩素酸ナトリウム0.1%に30分程度浸け置き
3. 水洗い後乾燥
（汚れがひどければ処分することも検討）




【掃除に使用した雑巾・モップ】

1. 付着した汚物を取り除く
2. 水の中で静かにもみ洗い
3. 次亜塩素酸ナトリウム0.1%に30分程度浸け置き
4. 水洗い後乾燥



【吐物の付着した食器】

- 厨房へ戻す前に
1. 吐物を取り除く
 2. 次亜塩素酸ナトリウム0.1%に30分程度浸け置き、厨房へ食器を戻す
 3. 食器用洗剤で洗浄



- 衣類や食器の下洗い
- 嘔吐後のうがい
に使用したシンクや手洗い場も次亜塩素酸ナトリウム0.02%で消毒しましょう

- ※ 消毒液の希釈方法は別紙「消毒液の作り方」を参照してください。
- ※ 次亜塩素酸ナトリウムには漂白作用がありますので、使用上の注意を確認してください。
- ※ 幼児がなめるおもちゃ類は消毒後、陽に干して乾燥させましょう。

参考

ノロウイルスに関するQ&A 厚労省
社会福祉施設における感染対策標準マニュアル
保育所における感染症対策ガイドライン

兵庫県加古川健康福祉事務所 健康管理課